



Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του P στη χημική ένωση H_3PO_4 είναι:

- α. +5
- β. +1
- γ. +3
- δ. -3

Μονάδες 5

1.2. Σε 3 mol H_2SO_4 περιέχονται:

- α. N_A μόρια H_2SO_4
- β. 3 μόρια H_2SO_4
- γ. 12 N_A άτομα O
- δ. 2 N_A άτομα H

Μονάδες 5

1.3. Αν διπλασιαστεί ο όγκος ενός ιδανικού αερίου υπό σταθερή θερμοκρασία χωρίς μεταβολή της ποσότητας του αερίου, τότε η πίεσή του:

- α. διπλασιάζεται
- β. υποδιπλασιάζεται
- γ. τετραπλασιάζεται
- δ. υποτετραπλασιάζεται

Μονάδες 5

1.4. Ατομικότητα στοιχείου είναι:

- α. ο αριθμός που δείχνει από πόσα πρωτόνια συγκροτείται ο πυρήνας του ατόμου του στοιχείου.
- β. ο αριθμός που δείχνει από πόσα νετρόνια συγκροτείται ο πυρήνας του ατόμου του στοιχείου.
- γ. ο αριθμός που δείχνει από πόσα άτομα συγκροτείται το μόριο του στοιχείου.
- δ. ο αριθμός που δείχνει από πόσα μόρια συγκροτείται το mol του στοιχείου.

Μονάδες 5

1.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Τα διαλύματα είναι ετερογενή μίγματα
- Η διαλυτότητα ενός στερεού αυξάνεται συνήθως με αύξηση της θερμοκρασίας
- Στις ιοντικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του μορίου
- Σχετική μοριακή μάζα ή μοριακό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του μορίου του από το $1/12$ της μάζας του ατόμου του άνθρακα -12.
- Ο γραμμομοριακός όγκος (V_m) 1 mol αερίου ισούται με 22,4L σε οποιεσδήποτε συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2^ο

2.1. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας:

Στοιχείο	Z	A	p	n	e	Κατανομή σε στοιβάδες	Θέση στον Περιοδικό Πίνακα	
							Ομάδα	Περίοδος
A		39			19			
B				12	12			
Γ	17	35						
Δ		1			1			
E			17	19				

α. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά κελιά του.

Μονάδες 5

β. Τι ονομάζουμε ισότοπα, Να βρείτε ένα ζευγάρι ισωτόπων στον παραπάνω πίνακα.

Μονάδες 4 (3+1)

γ. Περιγράψτε το χημικό δεσμό που μπορούν να σχηματίσουν τα ζεύγη των παρακάτω ατόμων:

- B με Γ
- Γ με Δ
- Γ με Γ

Μονάδες 6 (2+2+2)

(*Οδηγία:* Χαρακτηρίστε τους δεσμούς που σχηματίζονται ως ιοντικό, πολωμένο ομοιοπολικό και μη πολωμένο ομοιοπολικό και εξηγήστε με λόγια και με χημικά σύμβολα πως σχηματίζεται ο δεσμός μεταξύ αυτών των ατόμων ή των ιόντων τους).

2.2. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά κελιά του.

Χημικός τύπος ένωσης	Ονομασία Ένωσης	Χημική κατηγορία
H ₂ S		
N ₂ O ₅	Πεντοξείδιο του Αζώτου	Όξινο οξείδιο
Na ₂ CO ₃		
	Υδροξείδιο του Νατρίου	
Na ₂ O		
CuNO ₃		

Μονάδες 5

2.3. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις:

- α) ...NaOH + ...NH₄Cl →
 β) ...F₂ + ...HBr →
 γ) ...H₃PO₄ + ...Mg(OH)₂ →
 δ) ...Ca + ... H₂O →
 ε) ...Ag₂SO₄ + ... HCl →

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3^ο

Διαθέτουμε τρία διαλύματα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) Α, Β, Γ με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Α. 500g διαλύματος NaOH πυκνότητας 1,25 g/mL που περιέχει 20g NaOH.
 Β. Διάλυμα NaOH 10% w/v.
 Γ. Διάλυμα NaOH c=1M.

α) Ποια είναι η επί τοις %w/w και η επί τοις % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Α;
 Μονάδες 8 (4+4)

β) Ποιος όγκος νερού πρέπει να προστεθεί σε 200mL του διαλύματος Β για να προκύψει διάλυμα με περιεκτικότητα 8% w/v;
 Μονάδες 8

γ) Να υπολογιστεί η επί τοις % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που θα προκύψει αν αναμιχθούν 200mL του διαλύματος Β με 300mL του διαλύματος Γ.
 Μονάδες 9

Δίνεται Mr NaOH=40.

ΘΕΜΑ 4^ο

Δίνονται 0,5 mol αερίου υδροχλωρίου (HCl).

- α) Να υπολογιστεί μάζα της παραπάνω ποσότητας και ο όγκος της μετρημένος σε stp. *Μονάδες 7*
- β) Να υπολογιστεί ο όγκος της παραπάνω ποσότητας του υδροχλωρίου μετρημένος σε P=2 atm και θερμοκρασία $\theta = 127\text{ }^{\circ}\text{C}$ *Μονάδες 5*
- γ) Αν ολόκληρη η ποσότητα του υδροχλωρίου διαλυθεί σε νερό, σχηματίζεται διάλυμα Δ1 όγκου 500 mL. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1. *Μονάδες 6*
- δ) Στο παραπάνω διάλυμα Δ1 διαλύουμε επί πλέον 9,125 g αερίου υδροχλωρίου, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2. *Μονάδες 7*

Δίνονται: παγκόσμια σταθερά των αερίων $R = \frac{82\text{ atm}\cdot\text{L}}{1000\text{ mol}\cdot\text{K}}$

Οι σχετικές ατομικές μάζες: H=1 , Cl=35,5

Καλή επιτυχία!